

## INFORME CLÍNIC PER A LA PRESCRIPCIÓ D'ANTIPSICÒTICS DE 2ª GENERACIÓ EN PACINENTS > 75 ANYS

Nom pacient:

CIP:

Indicació:

	Risperdal/Risperdal Flas (Risperidona, comp)	Risperdal (Risperidona, inj)	Olanzapina (Zyprexa, comp.)	Olanzapina (Zyprexa, inj.)	Quetapina (Seroquel)	Amisulpirida (Solian)	Aripiprazol (Abilify)	Ziprasidona (Zeldox càps.)	Ziprasidona (Zeldox inj.)
Tractament esquizofrènia									
Quadres psicòtics amb símptomes positius i/o negatius notables									
Demència associada a quadres psicòtics i episodis d'agressivitat greus o a trastorns de l'activitat (agitació i deambulació)									
Tractament episodis maníacs associats a trastrons bipolars									
Tractament episodi maníac moderat-greu									
Control ràpid de l'agitació en esquizofrènia quan el tractament oral no és adequat, màxim 3 dies									
Prevenió de recaigudes en pacients amb trastorn bipolar en què l'episodi maníac ha respost al tractament amb olanzapina									
Control ràpid de l'agitació en esquizofrènia o episodi maníac quan no és adequat el tractament oral									

DATA I SIGNATURA DEL METGE: