

TRATAMIENTO DE RESEVA PARA LA MALARIA

¿EN QUÉ SITUACIONES DEBERÁ UTILIZARSE?

Auto-tratamiento de emergencia ante la sospecha de padecer malaria:

- ➔ Se tomará en caso de presentar síntomas sugestivos de malaria (síntoma principal fiebre alta) y no poder llegar a un centro médico en el plazo de 24 horas.
- ➔ El tratamiento se comienza mientras se dirige hacia el centro médico más próximo.
- ➔ Tomar el tratamiento no exime de ir a un centro donde confirmen si tiene la enfermedad y revisen su estado general y el tratamiento a seguir.

HAY QUE TENER MUY CLARO QUE SE DEBE IR AL MÉDICO LO ANTES POSIBLE.

Ausencia de farmacia donde obtener el tratamiento contra la malaria:

- ➔ Se tomará el tratamiento de reserva en caso de haber sido diagnosticado de malaria en un centro médico, por no haber una farmacia donde obtener el tratamiento prescrito o tener dudas sobre la calidad de los fármacos.

Fármacos y dosis: Malarone®

EDAD	PESO (Kg)	COMPRIMIDOS
Adultos/Niños	>40	4 Compr. (Adultos)
Niños	5-8	2 Compr. (Pediátricos)
	9-10	3 Compr. (Pediátricos)
	11-20	1 Compr. (Adultos)
	21-30	2 Compr. (Adultos)
	31-40	3 Compr. (Adultos)

1 sola toma (todas la pastillas juntas) al día durante 3 días.

UNIDAD DE SALUD INTERNACIONAL

CATALUNYA CENTRAL



Si tenéis que viajar a un país exótico o tropical, venid a la UNIDAD DE SALUD INTERNACIONAL CATALUNYA CENTRAL

TENDRÍA QUE VENIR

Como mínimo, 6 semanas antes de iniciar el viaje.

DONDE DIRIGIRSE

Pedir hora al teléfono

ANOIA:

93 803 36 46 del CAP Igualada Urbá, Paseo de Mossèn Jacint Verdaguer 170, Igualada.

BAGES-BERGUEDÁ:

93 874 81 78 del CAP Bages, Calle Soler i Marc 6, Manresa.

OSONA:

93 889 02 22 del CAP Osona, Plaza Divina Pastora 6, Vic.

Se recomienda una visita previa al médico de cabecera.

UNIDAD DE SALUD INTERNACIONAL *Catalunya Central*

Tratamiento preventivo para la Malaria



MEFLOQUINA (Lariam®)



Dosis

Primera Dosis: 1 semana antes de entrar en la zona de riesgo. ___/___/___

Mantenimiento: 1 dosis cada semana. Mismo día de la semana que inicial.

Última Dosis: 4 semanas después de salir de la zona de riesgo. ___/___/___

¿Cómo tomarla?

Después de una de las comidas con un vaso de agua. NO se puede tomar alcohol el mismo día ni el siguiente.

Embarazo

No está contraindicado en el embarazo (Categoría B).

Se puede considerar evitar el embarazo hasta 3 meses después de haber terminado el tratamiento pero no es imprescindible. En caso de embarazo en este periodo, no es indicación de aborto terapéutico. En caso de embarazo mientras se está en zonas donde es imprescindible continuar la quimioprofilaxis (África Subsahariana), se puede seguir la quimioprofilaxis con mefloquina.

Lactancia

No está contraindicado.

Reacciones adversas

Más habituales: náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareo. Suelen ceder tras las primeras dosis.

Puede producir sueños extraños hasta 3 semanas después de terminar el tratamiento.

Interrumpir el tratamiento y consultar al médico si:
Ataques de pánico, síntomas depresivos, alucinaciones o convulsiones.
Palpitaciones continuadas.

Contraindicaciones

Epilepsia, arritmias, algunos trastornos psiquiátricos.

ATOVAQUONA+PROGUANIL (Malarone®)

Dosis

___ comprimidos

Primera Dosis: 1 día antes de entrar en la zona de riesgo. ___/___/___

Mantenimiento: 1 dosis cada día.

Última Dosis: 7 días después de salir de la zona de riesgo. ___/___/___

¿Cómo tomarla?

Después de una de las comidas con un vaso de agua.

Embarazo

Contraindicado.

Hay que evitar el embarazo hasta 3 semanas después de haber terminado el tratamiento. Sin embargo, en caso de embarazo en este periodo, no es indicación de aborto terapéutico.

Lactancia

No está contraindicado.

Reacciones adversas

Más habituales: náuseas, vómitos, dolor abdominal. Suelen ceder tras las primeras dosis.

Interrumpir el tratamiento y consultar al médico si:
Picores importantes, úlceras en la boca.

No se pueden tomar antiácidos 2 horas antes ni 2 horas después del Malarone®.



DOXICICLINA (Proderma 100®)

Dosis

1 comprimido.

Primera Dosis: 1 día antes de entrar en la zona de riesgo. ___/___/___

Mantenimiento: 1 dosis cada día.

Última Dosis: 28 días después de salir de la zona de riesgo. ___/___/___

¿Cómo tomarla?

Tomarla 1 hora después de una comida.

Embarazo

Contraindicado.

Hay que evitar el embarazo hasta 1 semana después de haber terminado el tratamiento. Sin embargo, en caso de embarazo en este periodo, no es indicación de aborto terapéutico.

Lactancia

Contraindicado.

Niños

Contraindicado en niños menores de 8 años.

Reacciones adversas

Más habituales: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Suelen ceder tras las primeras dosis. Vaginitis.

Fotosensibilidad 4% de los casos.

Interrumpir el tratamiento y consultar al médico si:
Diarreas importantes. Enrojecimiento importante de la cara.

No se pueden tomar antiácidos 2 horas antes ni 2 horas después del Proderma®.
Disminuye la acción de los Anticonceptivos Orales. Debe tomarse precauciones adicionales.

