

TRACTAMENT DE RESERVA PER A LA MALÀRIA

EN QUINES SITUACIONS S'HAURÀ DE FER SERVIR?

Autotractament d'emergència per sospita de patir malària:

- ➔ Es prendrà en cas de presentar símptomes suggestius de malària (síntoma principal febre alta) i no poder arribar a un centre mèdic en el termini de 24 hores.
- ➔ El tractament es comença mentre es dirigeix cap al centre mèdic més pròxim.
- ➔ Prendre el tractament no eximeix d'anar a un centre on confirmin si té la malaltia i revisin el seu estat general i el tractament.

CAL TENIR MOLT CLAR QUE S'HA D'ANAR AL METGE AL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Absència de farmàcia on obtenir el tractament contra la malària:

- ➔ Es prendrà el tractament de reserva en cas d'haver estat diagnosticat de malària en un centre mèdic, però no haver-hi una farmàcia on obtenir el tractament prescrit o tenir dubtes de la qualitat dels fàrmacs.

Fàrmac i dosis: Malarone®

EDAT	PES (Kg)	COMPRIMITS
Adults/Nens	>40	4 Compr. (Adults)
Nens	5-8	2 Compr. (Pediàtrics)
	9-10	3 Compr. (Pediàtrics)
	11-20	1 Compr. (Adults)
	21-30	2 Compr. (Adults)
	31-40	3 Compr. (Adults)

1 Sola presa (totes les pastilles juntes) al dia durant 3 dies

UNITAT DE SALUT INTERNACIONAL

CATALUNYA CENTRAL



Si heu de viatjar a un país exòtic o tropical, veniu a la
**UNITAT DE SALUT
INTERNACIONAL
DE LA CATALUNYA CENTRAL**

CALDRIA VENIR

Com a mínim, 6 setmanes abans d'iniciar el viatge.

ON ADREÇAR-SE

Demaneu hora al telèfon

ANOIA:

93 803 36 46 del CAP Igualada Urbà, Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer 170, Igualada.

BAGES-BERGUEDÀ:

93 874 81 78 del CAP Bages, Carrer Soler i Marc 6, Manresa.

OSONA:

93 889 02 22 del CAP d'Osona, Plaça Divina Pastora 6, Vic.

Es recomana una visita prèvia al metge de capçalera.

UNITAT DE SALUT INTERNACIONAL *Catalunya Central*

Tractament preventiu per la Malària



MEFLOQUINA (Lariam®)



Dosi

Primera Dosi: 1 setmana abans d'entrar a la zona de risc. ____/____/____

Manteniment: 1 dosi cada setmana. Mateix dia de setmana que inicial.

Darrera Dosi: 4 setmanes després de sortir de la zona de risc. ____/____/____

Com prendre-la?

Prendre-la després d'un dels àpats amb un got d'aigua. NO es pot prendre alcohol el mateix dia ni l'endemà.

Embaràs

No està contraindicat en l'embaràs (Categoria B).

Es pot considerar evitar l'embaràs fins 3 mesos després d'haver acabat el tractament però no és imprescindible. Malgrat tot, en cas d'embaràs en aquest període, no és indicació d'avortament terapèutic.

En cas d'embaràs mentre s'està en zones on és imprescindible continuar la quimioprofilaxi (Àfrica Sub-sahariana) es pot seguir la quimioprofilaxi amb mefloquina.

Lactància

Es pot prendre.

Reaccions adverses

Més habituals: nàusees, vòmits, dolor abdominal, mal de cap, mareig, insomni. Acostumen a cedir després de les primeres dosis.

Pot produir somnis estranys fins a 3 setmanes després d'acabar el tractament.

Interrompre el tractament i consultar el metge si:

Atacs de pànic, símptomes depressius, al·lucinacions o convulsions.
Palpitacions continuades.

Contraindicacions

Epilèpsia, arítmies, alguns trastorns psiquiàtrics.

ATOVAQUONA+PROGUANIL (Malarone®)

Dosi

____ comprimits

Primera Dosi: 1 dia abans d'entrar a la zona de risc.

____/____/____

Manteniment: 1 dosi cada dia.

Darrera Dosi: 7 dies després de sortir de la zona de risc. ____/____/____

Com prendre-la?

Després d'un dels àpats amb un got d'aigua.

Embaràs

No es pot prendre.

Cal evitar l'embaràs fins 3 setmanes després d'haver acabat el tractament. Malgrat tot, en cas d'embaràs en aquest període, no és indicació d'avortament terapèutic.

Lactància

No es pot prendre.

Reaccions adverses

Més habituals: nàusees, vòmits, dolor abdominal. Acostumen a cedir després de les primeres dosis.

Interrompre el tractament i consultar el metge si:

Picors importants, úlceres a la boca.

No es poden prendre antiàcids 2 hores abans ni 2 hores després del Malarone®.



DOXICICLINA (Proderma 100®)

Dosi

1 comprimit.

Primera Dosi: 1 dia abans d'entrar a la zona de risc.

____/____/____

Manteniment: 1 dosi cada dia.

Darrera Dosi: 28 dies després de sortir de la zona de risc. ____/____/____

Com prendre-la?

Prendre-la 1 hora després d'un àpat.

Embaràs

No es pot prendre.

Cal evitar l'embaràs fins 1 setmana després d'haver acabat el tractament. Malgrat tot, en cas d'embaràs en aquest període, no és indicació d'avortament terapèutic.

Lactància

No es pot prendre.

Nens

No el poden prendre els nens menors de 8 anys.

Reaccions adverses

Més habituals: nàusees, vòmits, dolor abdominal, diarrea. Acostumen a cedir després de les primeres dosis.

Vaginitis.

Fotosensibilitat 4% dels casos.

Interrompre el tractament i consultar el metge si:

Diàrrees importants. Vermellor important de la cara.

No es poden prendre antiàcids 2 hores abans ni 2 hores després del Proderma®.

Disminueix l'acció dels Anticonceptius Orals. Heu de prendre precaucions addicionals.

