

## TRAITEMENT ANTIPALUDIQUE DE RESERVE

### DANS QUELLES SITUATIONS L'UTILISER?

#### Auto-traitement d'urgence si vous pensez souffrir du paludisme:

- ➔ Prendre le traitement en cas de symptômes évocateurs du paludisme (symptôme principal fièvre élevée), s'il vous est impossible d'atteindre un centre médical dans les 24 heures.
- ➔ Démarrer le traitement tout en vous dirigeant vers le centre médical le plus proche.
- ➔ Prendre le traitement ne dispense pas de se rendre dans un centre médical pour confirmer la maladie et reconsidérer le traitement.

#### RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN LE PLUS TÔT POSSIBLE.

#### Absence de pharmacie où obtenir le traitement antipaludique:

- ➔ Le traitement est pris si le diagnostic du paludisme a été établi dans un centre médical mais que le traitement prescrit n'est pas disponible en pharmacie, ou si vous avez des doutes sur la qualité des médicaments.

#### Posologie et durée: Malarone®

AGE	POIDS (Kg)	COMPRIMÉS
Adultes/Enfants	>40	4 Comprimés Adultes
Enfants	5-8	2 Comprimés Pédiatriq.
	9-10	3 Comprimés Pédiatriq.
	11-20	1 Comprimés Adultes
	21-30	2 Comprimés Adultes
	31-40	3 Comprimés Adultes

*Les comprimés sont administrés en une prise par jour pendant 3 jours*

## UNITAT DE SALUT INTERNACIONAL

### CATALUNYA CENTRAL



Si vous devez voyager à un pays exotique ou tropical, venez au UNITAT DE SALUT INTERNACIONAL (Unité de Santé Internationale)

### IL FAUDRAIT VENIR

Minimum 6 semaines avant de commencer le voyage.

### OU S'ADRESSER

Demandez rendez-vous au téléphone

#### **ANOIA:**

**93 803 36 46 CAP Igualada Urbà, Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer 170, Igualada.**

#### **BAGES-BERGUEDA:**

**93 874 81 78 CAP Bages, Carrer Soler i March 6, Manresa.**

#### **OSONA:**

**93 889 02 22 CAP Osona, Plaça Divina Pastora 6, Vic.**

*Une visite préalable à votre médecin de famille est recommandé.*

# UNITAT DE SALUT INTERNACIONAL *Catalunya Central* (Unité de Santé Internationale)

*Traitement préventif contre le Paludisme*



## MEFLOQUINA (Lariam®)



### Dose

**Première dose:** 1 semaine avant d'entrer dans la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Continuation:** 1 dose chaque semaine. Toujours le même jour.

**Dernière Dose:** 4 semaines après avoir quitté la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Comment le prendre?

Prendre après un repas avec un verre d'eau. Ne pas boire d'alcool le jour même de la prise ou le lendemain.

### Grossesse

Pas de contre-indication (catégorie B).

En cas de survenue d'une grossesse lors qu'on est dans une zone où est essentiel de faire chimioprophylaxie, on peut continuer avec méfloquine.

Il peut être considéré d'éviter une grossesse jusqu'à 3 mois après la fin du traitement mais ce n'est pas indispensable. Toutefois, en cas de survenue d'une grossesse pendant cette période, l'avortement thérapeutique n'est pas indiqué.

### Allaitement

Pas de contre-indication.

### Effets indésirables

Peut provoquer : troubles digestifs, vertiges, céphalées, troubles du sommeil.

Ces effets sont habituellement transitoires.

Interrompre le traitement et consulter un médecin

si:

Attaques de panique, dépression, hallucinations et convulsions ou palpitations continues.

### Contreindications

Épilepsie, arythmies, quelques troubles psychiatriques.

## ATOVAQUONA+PROGUANIL (Malarone®)

### Dose

\_\_\_ comprimés.

**Première dose:** 1 jour avant d'entrer dans la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Continuation:** 1 dose tous les jours.

**Dernière Dose:** 7 jours après avoir quitté la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Comment le prendre?

Après un repas avec un verre d'eau.

### Grossesse

Contre-indiqué.

Eviter la grossesse jusqu'à 3 semaines après la fin du traitement. Toutefois, en cas de grossesse pendant cette période l'avortement thérapeutique n'est pas indiquée.

### Allaitement

Contre-indiqué.

### Effets indésirables

Fréquent: nausées, vomissements, douleurs abdominales. Ils cèdent après les premières doses.

Interrompre le traitement et consulter un médecin

si:  
Prurit Important, plaies dans la bouche.

Ne pas prendre des antiacides 2 heures avant ou 2 heures après Malarone®.



## DOXICICLINA (Proderma 100®)

### Dose

1 comprimé.

**Première Dose:** 1 jour avant d'entrer dans la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Continuation:** 1 dose tous les jours.

**Dernière Dose:** 28 jours après avoir quitté la zone à risque. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Comment le prendre?

Prendre 1 heure après un repas.

### Grossesse

Contre-indiqué.

Eviter la grossesse jusqu'à 1 semaine après la fin du traitement. Toutefois, en cas de grossesse pendant cette période l'avortement thérapeutique n'est pas indiquée.

### Allaitement

Contre-indiqué.

### Enfants

Contre-indiqué en enfants de moins de 8 ans.

### Effets indésirables

Fréquent: nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée. Ils cèdent après les premières doses.

Vaginite.

Photosensibilité 4% des cas.

Interrompre le traitement et consulter un médecin

si:

Diarrhée importante. Rougeur importante du visage.

Ne pas prendre des antiacides 2 heures avant ou 2 heures après Proderma®.

Diminue l'action des contraceptifs oraux. Prendre des précautions supplémentaires.