

Jornada de Formació Servei d'Oftalmologia del CHV

8 i 15 d'octubre 2015

Dr. José Licari



CONSORCI HOSPITALARI DE VIC



DMAE


La degeneració macular associada a l'edat (DMAE) és un desgast progressiu de la visió central.

- És la primera causa irreversible de ceguera legal en persones >65 anys en el món occidental.
- Augmenta el nombre a l'augmentar l'esperança de vida.

DMAE

Classificació:

- DMAE atròfica: 80% dels casos s'inicien amb la formació de dipòsits anormals: drusas a l'àrea macular.



DMAE: Atròfica

Símtomes:

- Pèrdua progressiva de l'AV
- Dificultat en la lectura
- Metamorfopsia (Rejilla de Amsler)

Proves diagnòstiques:

- Fons d'ull
- OCT de màcula

Tractament:

No hi ha tractament efectiu per aturar la progressió de la malaltia.

La derivació s'ha de fer de forma preferent i no urgent .


DMAE: Exudativa

Representa el 20% del casos

És una neovascularització procedent de la retina (MNVSR)

Síntomes:

- Pèrdua progressiva i accelerada l'AV
- Escotoma central
- Metamorfopsia
- Dificultat per a la lectura



DMAE

Proves diagnòstiques:

- OCT de màcula
- AFG
- Verd d'indiocianina

Tractament:

Anti-VEGF (antifactor de creixement endotelial vascular)

- Ranibizumab (Lucentis)
- Bevacizumab (Avastin)
- Aflibercept (Eylea)