



CODI ICTUS

Data revisió: març 2014 (Anna Ribas)

Data propera revisió: març 2016

Responsable manteniment: Anna M. Rodríguez Ferre

Anna Ribas i Casals

Directora ABS Sta Eugènia de Berga

Arxiu informàtic: Au!Gènia digital > Protocols <http://www.augenia.cat/protocols.html>



CODI ICTUS

PACIENT DIANA:

- Edat 18-85¹ anys amb Rankin $\leq 2^2$
- Inici <8h d'evolució, al despertar o temps desconegut
- Dèficit neurològic focal objectivat (un o més)



ESCALA CINCINNATI

- Asimetria facial
- Pèrdua força extremitat
- Anomalia llenguatge

Activació
CODI ICTUS



061-112

CAL:

- **Hora exacta** d'inici de símptomes
- **Exploració física:** PRESSIÓ ARTERIAL cada 15 minuts / FREQUÈNCIA CARDÍACA/ Sat O₂ / GLICÈMIA D'INICI
- **Capçal incorporat a 30°, si vòmits, decúbit lateral**
- **Retirar pròtesis dentals, aspirar secrecions**
- VALORACIÓ DEL NIVELL DE CONCIÈNCIA de manera continuada, GLASGOW³ i RANKIN². Valorar pupil·les

TRACTAMENT:

- Si sat O₂ >90% **NO** administrar O₂
- COL·LOCAR VIA ENDOVENOSA A FLEXURA DEL COLZE. Evitar Sèrum Glucosat excepte hipoglicèmia (SG 5-10%)
- **HTA**
 - o No tractar, excepte si PAD>120 ó PAS>220, o si a més, sospitem IAM/IC o encefalopatia hipertensiva
 - CAPTOPRIL vo 12'5/25/50/100 (dosi màx 300)
 - DOXAZOSINA 2/4 (dosi màx 8)
 - ATENOLOL 50, 100 (dosi màx 100)
- No reduir >25% de la PA a la que hem trobat el pacient amb ictus
- **Antitèrmics:** 1 g paracetamol si T^a ax >37'5°C
- **NO administrar AAS**

¹Edat en revisió, primar la qualitat de vida prèvia del pacient i la seva autonomia personal

²Escala Rankin: **0** sense símptomes/ **1** No hi ha discapacitat significativa tot i la simptomatologia/

2 Discapacitat lleugera/ **3** Discapacitat moderada (necessita ajuda però pot caminar sense assistència)/

4 Discapacitat moderadament greu (no camina sense assistència)/ **5** Discapacitat greu (no s'aixeca, incontinent, atenció constant)/ **6** Mort



³Escala de Coma de GLASGOW

<u>Resposta ocular (O)</u>	<u>Resposta motora (M)</u>	<u>Resposta verbal (V)</u>
Obertura ocular	Davant ordre verbal	5 Conversació orientada
4 Espontània	6 Obeeix	4 Conversació confosa
3 Per ordre verbal	Davant estímul nociceptiu	3 Paraules incongruents
2 Per estímuls dolorosos	5 Localitza el dolor	2 Sons incomprensibles
1 Cap resposta	4 Enretira	1 Cap resposta
	3 Flexió anormal (decorticació)	
	2 Extensió anormal (descerebració)	
	1 Cap resposta	

Per a la puntuació s'escollirà sempre la millor resposta, p.ex. si en extremitat dreta la resposta motora és de retirada (4) i en l'esquerra de decorticació (3), la puntuació escollida serà 4.

Especificarem la resposta en cadascun dels apartats i realitzarem la suma final.

Sospites que algú té un ICTUS? FES QUE...



RÀPID
*la teva actuació
pot salvar-li la vida*

COM ESTAVA ABANS DE L'ICTUS?

SI PODIA VESTIR-SE



SI TENIA MOBILITAT



SI PODIA ANAR AL BANY



...ACTIVA EL CODI ICTUS!

< 8h D'EVOLUCIÓ



- No compta l'edat si podia fer aquestes accions abans de l'ictus.
- Si l'autonomia no és absoluta, valorar la situació i activar davant el dubte.
- Activar si la persona es autònoma, encara que necessiti suports.
- Ictus transitori: Hospital de referència dintre de les primeres 24 hores.