



abs santa eugènia de berga

CODI ICTUS

Data revisió: maig 2012

Data propera revisió: maig 2014

Responsable manteniment: Anna M. Rodríguez Ferre

Anna Ribas i Casals

Directora ABS Sta Eugènia de Berga

Arxiu informàtic: Au!Gènia digital > Protocols <http://www.augenia.cat/protocols.html>



CODI ICTUS

PACIENT DIANA:

- Edat 18-85¹ anys amb Rankin $\leq 2^2$
- Inici <6h d'evolució, al despertar o temps desconegut
- Dèficit neurològic focal objectivat (un o més)

Activació
CODI ICTUS

061-112

ESCALA CINCINNATI

- Asimetria facial
- Pèrdua força extremitat
- Anomalia llenguatge

CAL:

- **Hora exacta** d'inici de símptomes
- **Exploració física:** PRESSIÓ ARTERIAL cada 15 minuts / FREQUÈNCIA CARDÍACA/ Sat O₂ / GLICÈMIA D'INICI
- **Capçal incorporat a 30°**, si vòmits, **decúbit lateral**
- **Retirar pròtesis dentals, aspirar secrecions**
- VALORACIÓ DEL NIVELL DE CONCIÈNCIA de manera continuada, GLASGOW³ i RANKIN². Valorar pupil·les

TRACTAMENT:

- Si sat O₂ >90% **NO** administrar O₂
- COL·LOCAR VIA ENDOVENOSA A FLEXURA DEL COLZE. Evitar Sèrum Glucosat excepte hipoglicèmia (SG 5-10%)
- **HTA**
 - No tractar, excepte si PAD>120 ó PAS>220, o si a més, sospitem IAM/IC o encefalopatia hipertensiva
 - CAPTOPRIL vo 12'5/25/50/100 (dosi màx 300)
 - DOXAZOSINA 2/4 (dosi màx 8)
 - ATENOLOL 50, 100 (dosi màx 100)

No reduir >25% de la PA a la que hem trobat el pacient amb ictus

- **Antitèrmics:** 1 g paracetamol si T^a ax >37'5°C
- **NO administrar AAS**

¹Edat en revisió, primar la qualitat de vida prèvia del pacient i la seva autonomia personal

²Escala Rankin: **0** sense símptomes/ **1** No hi ha discapacitat significativa tot i la simptomatologia/

2 Discapacitat lleugera/ **3** Discapacitat moderada (necessita ajuda però pot caminar sense assistència)/

4 Discapacitat moderadament greu (no camina sense assistència)/ **5** Discapacitat greu (no s'aixeca, incontinent, atenció constant)/ **6** Mort



3 Escala de Coma de GLASGOW

<u>Resposta ocular (O)</u>	<u>Resposta motora (M)</u>	<u>Resposta verbal (V)</u>
Obertura ocular	Davant ordre verbal	5 Conversació orientada
4 Espontània	6 Obeeix	4 Conversació confosa
3 Per ordre verbal	Davant estímul nociceptiu	3 Paraules incongruents
2 Per estímuls dolorosos	5 Localitza el dolor	2 Sons incomprensibles
1 Cap resposta	4 Enretira	1 Cap resposta
	3 Flexió anormal (decorticació)	
	2 Extensió anormal (descerebració)	
	1 Cap resposta	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per a la puntuació s'escollirà sempre la millor resposta, p.ex. si en extremitat dreta la resposta motora és de retirada (4) i en l'esquerra de decorticació (3), la puntuació escollida serà 4.

Especificarem la resposta en cadascun dels apartats i realitzarem la suma final.