

PROTOCOL OTITIS MITJA

DIAGNÒSTIC DE CERTESA (cumpleix 3 de 3):

- Inici agut (<48h)
- Otoposcopia amb exudat
 - o Abombament
 - o Otorrea
- Inflamació

DIAGNÒSTIC PROBABLE (2 de 3)

- Inici agut
 - Sense otàlgia: exudat a oïda mitja amb intensa hiperèmia
 - No es visualitza timpà a otoposcopia: amb otàlgia o irritabilitat
- (si infecció vies resp sup: augmenta grau de sospita)

NENS >2 ANYS
SENSE criteris de severitat, bilateralitat o otorrea.

NENS <2 ANYS o >2 ANYS AMB un criteri:

- Severitat (febre alta o otàlgia important)
- OMA bilateral

LACTANT < 6 MESOS o NEN entre 6 MESOS-2 ANYS amb antec de inf vies resp altes recent o NEN > 2 ANYS amb IVRA + 1 criteri: severitat, bilateralitat o otorrea.

NEN > 6 MESOS
SENSE antecedent IVRA

TRACTAMENT ANTIBIÒTIC

TRACTAMENT SIMPTOMÀTIC
Reavaluació en 48 hores

TRACTAMENT ANTIBIÒTIC:

INDICACIONS GENERALS:

- < 6 mesos (dx de certesa o sospita)
- 6m – 2 anys amb dx certesa OMA o sospita + IVRA
- > 2 anys amb criteris severitat, OMA bilateral o otorrea
- Nens amb OMA greu (febre >39°C, otàlgia intensa), otorrea o OMA bilateral.

FÀRMACS:

- Amoxicilina a 80-90 mg/kg/dia en 3 dosis (màx 6 gr/dia)
- Amoxicilina-clavulànic a 80-90 mg/kg/dia en 3 dosis (màx 3 gr/dia). Indicacions:
 - o < 6 mesos o no vacunats
 - o Lactants amb clínica greu (febre >39°C o otàlgia intensa)
 - o Història familiar de seqüeles òtiques per OMA
 - o Fallo terapèutic a Amoxicilina en 72h